

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АРАЛИИ НАСТОЙКА

Номер регистрационного удостоверения:

Торговое наименование препарата: Аралии настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Аралии маньчжурской корней настойка

Лекарственная форма: настойка

Состав.

Для получения препарата используют:

Аралии маньчжурской корни - 200 г

Вспомогательное вещество:

Этанол (спирт этиловый) 70 % - достаточное количество до получения 1000 мл препарата

Описание

Прозрачная жидкость от коричневато-желтого до желтовато-коричневого цвета, со слабым характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Общетонизирующее средство растительного происхождения.

Код ATX: A13A

Фармакологические свойства

Стимулирует центральную нервную систему, оказывает тонизирующее, гипертензивное, гипогликемическое действие.

Показания к применению

Артериальная гипотония, астенический синдром, физическое и психическое переутомление.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, острый период течения инфекционно-воспалительных заболеваний; хронические заболевания печени; повышенная возбудимость, нарушения сна (бессонница), эпилепсия, гиперкинез. Препарат не рекомендуется при беременности, в период грудного вскармливания и детям до 12 лет.

С осторожностью

Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП - 005921-181119

СОГЛАСОВАНО

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания не рекомендуется.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет по 30-40 капель, разведенных в $\frac{1}{4}$ стакана воды, 2 раза в день после еды (утром и в середине дня); курс лечения – 15-30 дней. Повторный курс – по рекомендации врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, нарушения сна (бессонница), тахикардия, повышение артериального давления, головная боль, гипогликемия.

Если при применении препарата наблюдаются нежелательные реакции, или Вы заметили побочные эффекты, не указанные в данной инструкции, прекратите применение препарата и обратитесь к врачу.

Передозировка

При приеме препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов (тошнота, рвота, носовое кровотечение, гипогликемия). Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно потенцирование действия стимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора, фенамин и др.), препарат является физиологическим антагонистом снотворного действия средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных препаратов и т.д.).

Особые указания

Не рекомендуется принимать в вечерние часы (во избежание развития нарушений ночного сна). Имеется четко выраженная сезонность действия: применение осенью и зимой наиболее эффективно.

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых и детей старше 12 лет составляет 0,96 г, в максимальной суточной дозе для взрослых и детей старше 12 лет – 1,93 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Настойка.

По 25 мл во флаконы или флаконы-капельницы оранжевого стекла или полимерные.

По 0,9 кг, 2,7 кг, 4,5 кг, 9 кг, 19 кг, 20 кг, 30 кг, 45 кг в канистры из полиэтилена низкого давления (для стационаров и для приготовления лекарственных форм).

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного марки А или типа хром-эрзац.

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку из картона.

На канистры наклеивают инструкции по медицинскому применению.

Флаконы, флаконы-капельницы в количестве от 10 до 200 с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в пленку полиэтиленовую термоусадочную или в ящик из гофрированного картона, или в коробку из картона (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 12 до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

ООО «БЭГРИФ», Россия, 633010, Новосибирская обл., г. Бердск,
ул. Химзаводская, 11/19.

Тел./факс (383) 212-59-73, (383-41) 2-97-53

Директор ООО «БЭГРИФ»



 С.И. Тимофеев



Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью
количество листов 3).

Директор С.И.Тимофеев

«ДГИО»
г.Бердск Новосибирская область