

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ

№ - 006647-141220

СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Камфорный спирт

Номер регистрационного удостоверения:

Торговое наименование : Камфорный спирт

Группировочное наименование:

Камфора

Лекарственная форма: раствор для наружного применения спиртовой

Состав:

2 %

10 %

Действующее вещество:

Камфора рацемическая

2 г

10 г

Вспомогательное вещество:

Этанол (спирт этиловый) 70 %

до 100 мл

до 100 мл

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Местнораздражающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: M02AX10

Фармакологические свойства

Оказывает местнораздражающее, антисептическое, противовоспалительное и анальгезирующее действие. Возбуждает чувствительные нервные окончания кожи, рефлекторно улучшает трофику органов и тканей.

Фармакокинетика

При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизменном виде легкими и с желчью.

Показания к применению

Миалгия, миозит, артралгия, ишиас, профилактика образования пролежней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема).

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно: миалгия, миозит, артралгия, ишиас: наносят на кожу над пораженной областью 2-3 раза в день. Курс лечения – 7-10 дней.

Профилактика образования пролежней: обработка кожных покровов 2-3 раза в день.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические кожные реакции (крапивница), раздражение кожи; головная боль, головокружение.

Если у Вас наблюдаются любые из указанных в инструкции побочных эффектов, или Вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Симптомы: возбуждение, тахикардия, судороги.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Не допускать попадания препарата в глаза. Препарат не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и поврежденные или воспаленные участки кожи. После применения препарата необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. При попадании препарата в рот или нос необходимо тщательно промыть их водой.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияние на выполнение опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и т. п.)

Форма выпуска

Раствор для наружного применения спиртовой 2 %, 10 %.

По 25, 30, 40, 50, 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробкой и крышкой навинчиваемой, или крышкой навинчиваемой с уплотняющим элементом, или колпачком алюминиевым. По 25, 50 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные пробкой и крышкой навинчиваемой, или крышкой навинчиваемой с уплотняющим элементом.

По 25, 50, 100 мл во флаконы или флаконы-капельницы полимерные, укупоренные пробкой и крышкой навинчиваемой, или крышкой навинчиваемой или крышкой укупорочно-навинчиваемой, или колпачком.

По 10 кг, 18 кг в бутылки оранжевого стекла (для стационаров).

По 0,9 кг, 4,5 кг, 9 кг, 20 кг в канистры из полиэтилена низкого давления (для стационаров).

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного марки А или типа хром-эрзац. Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку из картона.

Флаконы, флаконы-капельницы от 10 до 200 с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в пленку полиэтиленовую термоусадочную или в ящик из гофрированного картона, или в коробку из картона (для стационаров).

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «БЭГРИФ», 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Химзаводская, д. 11/19.
Тел./факс (383) 212-59-73, (383-41) 2-97-53

Директор ООО «БЭГРИФ»



С.И. Тимофеев