

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МУРАВЬИНЫЙ СПИРТ

Регистрационный номер:

Торговое наименование препарата: Муравьиный спирт

Международное непатентованное или группировочное наименование:
муравьиная кислота

Лекарственная форма: раствор для наружного применения спиртовой

Состав на 100 г:

Действующее вещество:

Муравьиная кислота

(в пересчете на 100 % вещества) - 1,4 г

Вспомогательное вещество:

Этанол (спирт этиловый) 70 % - 98,6 г

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Местнораздражающее средство.

Код ATX: M02AX10

Фармакологическое действие

Муравьиная кислота обладает местнораздражающим действием, расширяет сосуды, улучшает кровоснабжение тканей, уменьшает воспаление и боль.

Показания к применению

В составе комплексной терапии при невралгии, миалгии, артралгии в качестве отвлекающего средства.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема), детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных), беременность, период грудного вскармливания.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Наружно. Растирают кожу в болезненной области. Курс лечения продолжается в зависимости от лечебного эффекта, но не более 1-2 недель. При необходимости курс лечения можно повторить.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Гиперемия, зуд кожи, аллергические реакции.

Если у Вас наблюдаются любые из указанных в инструкции побочных эффектов, или Вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

При случайном приеме препарата внутрь возможны: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, гастралгия, нарушение функций сердечно-сосудистой системы, стимуляция или угнетение центральной нервной системы, нарушение зрения, циркуляторный коллапс, шок, в том числе с летальным исходом.

Лечение: следует немедленно обратиться к врачу. Рекомендуется промывание желудка, прием активированного угля, при необходимости – симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении с препаратами для наружного применения, которые содержат органические соединения, могут образоваться новые соединения и наблюдаться денатурация белковых компонентов.

Особые указания

Не допускается нанесение препарата на лицо и шею, половые органы, слизистые оболочки, раны. При попадании в глаза, следует тщательно промыть их обильно водой. После нанесения препарата необходимо вымыть руки.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с движущимися механизмами.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения спиртовой 1,4 %.

По 25, 30, 40, 50, 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробкой полимерной и крышкой полимерной навинчивающейся (с контролем первого вскрытия или без), или крышкой полимерной навинчивающейся с уплотняющим элементом (с контролем первого вскрытия или без), или колпачком алюминиевым.

По 25, 50 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные пробкой полимерной и крышкой полимерной навинчивающейся (с контролем первого вскрытия или без), или крышкой полимерной навинчивающейся с уплотняющим элементом (с контролем первого вскрытия или без).

По 25, 50, 100 мл во флаконы или флаконы-капельницы полимерные (полиэтилен, полиэтилентерефталат), укупоренные пробкой полимерной (насадкой) и крышкой полимерной навинчивающейся (с контролем первого вскрытия или без), или крышкой полимерной навинчивающейся (с контролем первого вскрытия или без), или крышкой полимерной укупорочно-навинчивающейся (с контролем первого вскрытия или без), или колпачком полимерным (с контролем первого вскрытия или без).

По 0,9 кг, 2,7 кг, 4,5 кг, 9 кг, 19 кг, 20 кг, 30 кг, 45 кг в канистры (окрашенные) из полиэтилена низкого давления (для стационаров).

Флаконы, флаконы-капельницы в количестве от 10 до 200 с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в пленку полиэтиленовую термоусадочную или в ящик из гофрированного картона, или в коробку из картона (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

ООО «БЭГРИФ», Россия, 633010, Новосибирская обл., г. Бердск,

ул. Химзаводская, 11/19.

Тел./факс (383) 212-59-73, (383-41) 2-97-53

Директор ООО «БЭГРИФ»



С.И. Тимофеев