

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП-005819-250919

СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПОЛЫНИ НАСТОЙКА

Номер регистрационного удостоверения:

Торговое наименование препарата: Полыни настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Полыни горькой травы настойка

Лекарственная форма: настойка

Состав

Для получения настойки используют:

Полыни горькой травы - 200 г

Вспомогательное вещество:

Этанол (спирт этиловый) 70 %

- достаточное количество для
получения 1000 мл

Описание

Прозрачная жидкость от коричневатого-зеленого до зеленоватого-коричневого цвета, с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Аппетита стимулятор растительного происхождения (горечь).

Код АТХ [A15]

Фармакологические свойства

Основными действующими веществами являются арсумин (сумма лактонов) и абсинтин (индивидуальный лактон). Раздражая вкусовые рецепторы слизистых оболочек рта и языка, полыни настойка вызывает рефлекторным путем усиление секреции желудочного сока, повышение аппетита, улучшение пищеварения. Оказывает противовоспалительное, желчегонное и противомикробное действие.

Показания к применению

Анорексия, гипо- и анацидный гастрит, хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей по гипомоторному типу.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам лекарственного препарата, повышенная желудочная секреция, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, острый холецистит, детский возраст до 12 лет.

Если у вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст старше 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь по 15-20 капель, разведенных в ¼ стакана воды, 2-3 раза в день за 20-30 минут до еды.

Курс лечения 20-25 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При длительном применении – изжога, гастралгия, диарея, тошнота, рвота.

Если у вас наблюдаются любые из указанных в инструкции побочных эффектов, или вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Возможны симптомы: тремор, головная боль, головокружение, судороги.

Лечение – симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

В максимальной суточной дозе содержится 0,66 г абсолютного спирта, в максимальной разовой дозе – 0,22 г абсолютного спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Следует воздержаться от управления автотранспортом и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Настойка.

По 25, 40, 50, 100 мл во флаконы или флаконы-капельницы оранжевого стекла.

По 25, 40, 50, 100 мл во флаконы или флаконы-капельницы полимерные.

По 0,9 кг, 2,7 кг, 4,5 кг, 9 кг, 19 кг, 20 кг, 30 кг, 45 кг в канистры из полиэтилена низкого давления (для стационаров).

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку из картона.

На канистры наклеивают инструкции по медицинскому применению.

Флаконы, флаконы-капельницы в количестве от 10 до 200 с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в пленку полиэтиленовую термоусадочную или в ящик из гофрированного картона, или в коробку из картона (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

ООО «БЭГРИФ», Россия, 633010, Новосибирская обл., г. Бердск,
ул. Химзаводская, 11/19.

Тел./факс (383) 212-59-73, (383-41) 2-97-53

Директор ООО «БЭГРИФ»



С.И. Тимофеев