

Составлено в  
Формате по  
1-й редакции  
Бланк  
использован  
Бланк  
использован

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА

МИНЗДРАВ РОССИИ

№р-00888/08- 160718

СОГЛАСОВАНО

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Валерианы настойка

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка

**Лекарственная форма:** Настойка

**Состав**

**Для получения 1 л настойки используют:**

Валерианы лекарственной корневищ с корнями - 200 г

**Вспомогательное вещество:**

Этанол (спирт этиловый) 70 % - достаточное количество до получения 1 л настойки

**Описание**

Прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета, с характерным запахом.

**Фармакологическая группа**

Седативное средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** N05CM09

**Фармакологические свойства**

Настойка валерианы проявляет умеренно выраженный седативный эффект. Действующим началом препарата являются сложный эфир борнеола и изовалериановой кислоты, свободная валериановая кислота. Седативный эффект наступает медленно, но достаточно стабильно. Кроме того, препарат оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта.

**Показания к применению**

Повышенная нервная возбудимость, бессонница, в составе комплексной терапии - функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы, спазмы органов желудочно-кишечного тракта.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 1 года.

**С осторожностью** – хронический энтероколит, заболевание печени, алкоголизм, черепно-мозговые травмы, заболевания головного мозга, эпилепсия, детский возраст от 1 года.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

Принимают внутрь, до еды, разводя в небольшом количестве воды. Взрослым по 20-30 капель на прием 3-4 раза в день, детям – по 1 капле на каждый год жизни 1-3 раза в день. Курс лечения – до 4 недель. Повторные курсы лечения возможны после согласования с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **Побочное действие**

Возможны вялость, слабость, сонливость, снижение работоспособности (особенно при применении в высоких дозах), при длительном применении – запоры. В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему, а также спазмолитиков.

### **Особые указания**

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых составляет 0,32 г, содержание абсолютного этилового спирта в максимальной суточной дозе препарата составляет 1,3 г. В одной капле препарата содержится 0,01 г абсолютного этилового спирта.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Настойка. По 15, 25 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробкой и крышкой навинчивающейся, или пробкой-капельницей и крышкой навинчивающейся, или крышкой навинчивающейся с уплотняющим элементом, или колпачком алюминиевым.

По 15, 25 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные пробкой-капельницей и крышкой навинчивающейся, или пробкой и крышкой навинчивающейся, или крышкой навинчивающейся с уплотняющим элементом.

По 15, 25 мл во флаконы или флаконы-капельницы полимерные, укупоренные пробкой и крышкой навинчивающейся, или укупоренные пробкой-капельницей и крышкой навинчивающейся, или крышкой навинчивающейся, или крышкой укупорочно-навинчивающейся, или колпачком.

На флаконы, флаконы-капельницы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящейся этикетки, или контратикетки.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного марки А или типа хром-эрзац.

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку из картона.

Флаконы, флаконы-капельницы с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в пленку полиэтиленовую термоусадочную или в ящик из офорированного картона, или в коробку из картона (для стационаров). На термоусадочную пленку, ящик, коробку наклеивают этикетки из бумаги этикеточной ли писчей, или самоклеящиеся этикетки, или контрэтикетки.

#### **Словия хранения**

хранить в защищенном от света месте при температуре от 8 до 25 °C.  
хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

года.

Не использовать по истечении срока годности.

#### **Словия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Производитель/организация, принимающая претензии:**

ОО «БЭГРИФ»,  
Россия, 633010, Новосибирская обл., г. Бердск,  
п. Химзаводская, 11/19.  
тел./факс (383) 212-59-73, (383-41) 2-97-53



С.И. Тимофеев

Флаконы, флаконы-капельницы с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в пленку полиэтиленовую термоусадочную или в ящик из гофрированного картона, или в коробку из картона (для стационаров).  
На термоусадочную пленку, ящик, коробку наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся этикетки, или контратикетки.

#### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 8 до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Производитель/организация, принимающая претензии:**

ООО «БЭГРИФ»,

Россия, 633010, Новосибирская обл., г. Бердск,  
ул. Химзаводская, 11/19.

Тел./факс (383) 212-59-73, (383-41) 2-97-53



Директор ООО «БЭГРИФ»

С.И. Тимофеев