

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЖЕНЬШЕНЯ НАСТОЙКА

МИНЗДРАВ РОССИИ  
ЛД - 008341-021010  
СОГЛАСОВАНО

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование препарата:** Женьшень настойка

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Женьшень настоящего корня настойка

**Лекарственная форма:** настойка

**Состав**

**Для получения препарата используют:**

Женьшень настоящего корня - 100 г

*Вспомогательное вещество:*

Этанол (спирт этиловый) 70 %

- достаточное количество до  
получения 1000 мл препарата

**Описание**

Прозрачная жидкость от светло-желтого до желтого цвета с характерным запахом

**Фармакотерапевтическая группа**

Общетонизирующее средство растительного происхождения

**Код АТХ [A13A]**

**Фармакологические свойства**

Фармакологическая активность обусловлена содержанием сапониновых гликозидов-гинзенозидов (панаксозиды А и В, панаквилон, панаксин), эфирных и жирных масел пектиновых веществ, витаминов, микро- и макроэлементов, а также фитоэстрогенов и даукостерина.

Стимулирует ЦНС, оказывает общетонизирующее и гипогликемическое действие: улучшает аппетит, повышает артериальное давление, умственную и физическую работоспособность, стимулирует половую функцию, уменьшает общую слабость, повышенную утомляемость, сонливость; снижает содержание холестерина и сахара в крови, активизирует деятельность коры надпочечников.

**Показания к применению**

Артериальная гипотензия (пониженное артериальное давление), астенический синдром, физическое и психическое переутомление, неврастенический синдром, период реконвалесценции после перенесенных длительных и тяжелых, в том числе инфекционных заболеваний, нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу, в комплексной терапии при ослаблении половой функции на почве неврастении; для повышения работоспособности и сопротивляемости организма.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, повышенная возбудимость, эпилепсия, судорожные состояния, бессонница, лихорадочный синдром на фоне острых инфекционных заболеваний, кровоточивость,

хронические заболевания печени, детский возраст (до 12 лет), беременность и период грудного вскармливания.

*Если у вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.*

### **С осторожностью**

Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга и печени, детский возраст с 12 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет за 30-40 мин до еды по 15-25 кап 2-3 раза в день. Курс лечения 30-40 дней. Целесообразность проведения повторного курса определяется врачом.

*Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.*

### **Побочное действие**

Аллергические реакции, тахикардия, головная боль, нарушение сна, повышение артериального давления, гипогликемия.

*Если у вас наблюдаются любые из указанных в инструкции побочных эффектов, или вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.*

### **Передозировка**

При превышении рекомендуемых доз возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Симптомы: повышение артериального давления, бессонница, носовое кровотечение, сыпь на теле, повышение температуры тела.

Лечение: симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (в том числе кофеина, камфоры и др). Проявляет антагонизм при взаимодействии с лекарственными средствами, угнетающими ЦНС, (противоэпилептические препараты, нейролептики, транквилизаторы и седативные средства). Усиливает эффект гипогликемических лекарственных средств. Усиливает действие варфарина. Повышает риск развития резистентности к петлевым диуретикам.

### **Особые указания**

Для предупреждения бессонницы следует избегать приема во второй половине дня. Имеется четко выраженная сезонность действия: применение осенью и зимой наиболее эффективно.

В максимальной суточной дозе препарата содержится 0,7 г абсолютного этилового спирта, в максимальной разовой дозе – 0,23 г абсолютного спирта.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### Форма выпуска

Настойка.

По 25 мл во флаконы или флаконы-капельницы оранжевого стекла.

По 25 мл во флаконы или флаконы-капельницы полимерные.

По 0,9 кг, 2,7 кг, 4,5 кг, 9 кг, 19 кг, 20 кг, 30 кг, 45 кг в канистры из полиэтилена низкого давления (для стационаров и приготовления лекарственных форм).

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного марки А или типа хром-эрзац.

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку из картона.

На канистры наклеивают инструкции по медицинскому применению.

Флаконы, флаконы-капельницы в количестве от 10 до 200 с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в пленку полиэтиленовую термоусадочную или в ящик из гофрированного картона, или в коробку из картона (для стационаров).

### Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

### Условия отпуска

Отпускается без рецепта.

### Производитель/организация, принимающая претензии:

ООО «БЭГРИФ», Россия, 633010, Новосибирская обл., г. Бердск,

ул. Химзаводская, 11/19.


Тел./факс (383) 212-59-73, (383-41) 2-97-53

Директор ООО «БЭГРИФ»



МИНЗДРАВ РОССИИ  
ЛП - 005841-081019  
СОГЛАСОВАНО

С.И. Тимофеев



Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью  
Количество листов 3  
Директор Е.И. Тимофеев