

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

ШИПОВНИКА СИРОП

Регистрационный номер и дата:

Торговое наименование: Шиповника сироп

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Шиповника плодов экстракт водный+аскорбиновая кислота

Лекарственная форма: сироп

Состав.

Для получения 100 г препарата используют:

Шиповника плодов экстракт водный – 31,8 г


Аскорбиновая кислота – 0,3 г

Вспомогательные вещества

Сахар (сахароза) – 67,7 г

Лимонной кислоты моногидрат - 0,2 г

(лимонная кислота моногидратная)



Описание

Густая однородная от светло-коричневого до красновато-коричневого цвета жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Средство растительного происхождения+витамин

Код АТХ А11GB

Фармакодинамика

Препарат способствует повышению неспецифической резистентности организма, усилению регенерации тканей, уменьшению проницаемости сосудов, принимает участие в углеводном и минеральном обмене, обладает желчегонными свойствами. Фармакологическое действие обусловлено наличием аскорбиновой кислоты и других веществ (каротиноидов, флавоноидов, органических кислот и др.), входящих в его состав.

Показания к применению

Профилактика гиповитаминоза витамина С.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, холелитиаз, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, детский возраст до 3 лет.

С осторожностью: больным сахарным диабетом (из-за высокого содержания сахара в препарате).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания по согласованию с врачом.

Способ применения и дозы

Внутрь: взрослым и детям старше 12 лет – по 1-2 столовые ложки (15-30 мл) сиропа 2-3 раза в день; детям от 3 до 6 лет – по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа, от 7 до 12 лет – по 1 десертной ложке (10 мл) сиропа 2-3 раза в день. Курс лечения – 15-30 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Вследствие наличия в препарате аскорбиновой кислоты возможно: повышение всасывания лекарственных средств группы пенициллина, тетрациклина и железа; снижение клинического эффекта гепарина и непрямых антикоагулянтов; увеличение риска развития кристаллурии при лечении салицилатами и сульфаниламидами; замедление выведения почками кислот, в том числе ацетилсалициловой кислоты; увеличение выведения лекарственных средств, имеющих щелочную реакцию, в том числе алкалоидов; снижение концентрации в крови пероральных контрацептивов.

Особые указания

В максимальной разовой дозе для взрослых содержится 2,2 хлебных единиц (ХЕ). В максимальной суточной дозе для взрослых 6,6 ХЕ.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Препарат не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Сироп.

По 100, 200, 250, 300 мл в бутылки стеклянные или по 100, 200, 250 мл во флаконы, банки стеклянные или полимерные, укупоренные крышками навинчиваемыми (с контролем первого вскрытия или без).

По 100 мл во флакон полимерный в комплекте с крышкой винтовой и мерным стаканом.

По 3, 5, 10, 20, 31,5 л в канистры из полиэтилена (для стационаров или для производственных отделов аптек).

Каждую бутылку, банку или флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку.

По 6, 12, 20, 45, 72 бутылок, банок, флаконов с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в ящик из гофрированного картона, или коробку из картона (для стационаров).

Допускается флаконы полимерные коричневого цвета, бутылки, флаконы стеклянные марки ОС с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещать в пленку полиэтиленовую термоусадочную.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

6 месяцев.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии

ООО «БЭГРИФ», Россия, 633010, Новосибирская область, г. Бердск,

ул. Химзаводская, 11/19.

Тел./факс (383) 212-59-73, (383-41) 2-97-53



С.И. Тимофеев


МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП-001255-030817

СОГЛАСОВАНО

Пропнувано и одумеровано и
сфрелено печатљу
количество листов

Зам. директора по качеству
А.В. Падика



17