

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗДРАВОССИИ

ЛП-006247-100620

СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

БОРНАЯ КИСЛОТА

Номер регистрационного удостоверения:

Торговое наименование препарата: Борная кислота

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Борная кислота

Лекарственная форма: раствор для местного применения спиртовой

Состав на 100 мл:

Действующее вещество:

Борная кислота - 3 г;

Вспомогательное вещество:

Этанол (спирт этиловый) 70 % - до 100 мл

Описание

Бесцветная прозрачная жидкость с характерным запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа

антисептическое средство.

Код ATX: D08AD

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Антисептическое средство, коагулирует белки (в т.ч. ферменты) микробной клетки, нарушает проницаемость клеточной стенки.

Фармакокинетика

Хорошо проникает через слизистые оболочки; медленно выводится и может накапливаться в органах и тканях. Выводится почками – 50 % (в течение 12 ч), остальное количество в течение 5-7 дней.

Показания к применению

Отит наружный (острый и хронический) без повреждения барабанной перепонки.

Противопоказания

Гиперчувствительность, хроническая почечная недостаточность, перфорация барабанной перепонки, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Способ применения и дозы

Местно.

При остром и хроническом отите по 3-5 капель наносят на турунду и вводят в наружный слуховой проход 2-3 раза в день. Курс лечения не должен превышать 3-5 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические кожные реакции (крапивница), раздражение кожи; головная боль, головокружение.

Если у Вас наблюдаются любые из указанных в инструкции побочных эффектов, или Вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном попадании препарата в рот возможны возбуждение, тахикардия, судороги. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Не допускать попадания препарата в глаза. Препарат не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и поврежденные или воспаленные участки кожи. После применения препарата необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. При попадании препарата в рот необходимо тщательно промыть его водой.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияние на выполнение опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и т. п.).

Форма выпуска

Раствор для местного применения спиртовой 3 %.

По 25, 30, 40, 50, 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробкой полимерной и крышкой полимерной навинчивающейся, или крышкой полимерной навинчивающейся с уплотняющим элементом, или колпачком алюминиевым.

По 25, 40, 50 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные пробкой полимерной и крышкой полимерной навинчивающейся или крышкой полимерной навинчивающейся с уплотняющим элементом

По 25, 40, 50, 100 мл во флаконы или флаконы-капельницы полимерные (полиэтилен, полиэтилентерефталат), укупоренные пробкой (насадкой) полимерной и крышкой полимерной навинчивающейся, или крышкой полимерной навинчивающейся, или крышкой полимерной укупорочно-навинчивающейся, или колпачком полимерным.

По 0,9 кг, 2,7 кг, 4,5 кг, 9 кг, 19 кг, 20 кг, 30 кг, 45 кг в канистры из полиэтилена низкого давления (для стационаров).

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку из картона.

На канистры наклеивают инструкции по медицинскому применению.

Флаконы, флаконы-капельницы в количестве от 10 до 200 с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в пленку полиэтиленовую термоусадочную или в ящик из гофрированного картона, или в коробку из картона (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

ООО «БЭГРИФ», Россия, 633010, Новосибирская обл., г. Бердск,
ул. Химзаводская, 11/19.

Тел./факс (383) 212-59-73, (383-41) 2-97-53



С.И. Тимофеев