

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Календулы настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Календулы лекарственной цветков настойка

Лекарственная форма: Настойка

Состав

Для получения настойки используют:

Ноготков цветки (календулы) - 100 г

Этанола (спирта этилового) 70 % - достаточное количество
до получения 1 л

Описание

Прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакологическая группа

Антисептическое и противовоспалительное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие

Настойка календулы оказывает антисептическое, желчегонное, спазмолитическое и местное противовоспалительное действие.

Показания к применению

Применяют наружно как антисептическое и противовоспалительное средство при порезах, ушибах, экземах; местно – для полоскания горла при воспалительных заболеваниях глотки (тонзиллит, фарингит, ларингит) и слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит).

Внутрь настойку календулы применяют при холецистите, холангите.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

При приеме внутрь – острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата внутрь при беременности и в период грудного вскармливания. Возможно наружное и местное применение препарата с учетом ожидаемой пользы для матери и возможного риска для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, внутрь. Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов (порезы) обрабатывают настойкой с помощью тампона. При ушибах и экземе применяют водный раствор настойки (1 чайную ложку на стакан воды) в виде примочек. Для полоскания горла и слизистой оболочки полости рта используют $\frac{1}{2}$ - 1 стакан водного раствора настойки. Курс лечения 1-2 недели.

Внутрь за 15 минут до еды применяют по 10 – 20 капель, разведенных в $\frac{1}{4}$ стакана воды, 3 раза в день. Курс лечения 3-4 недели.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (в т.ч. кожный зуд). При приеме внутрь – изжога, тошнота, горечь во рту, боль в животе.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,23 г, в максимальной суточной дозе – 0,7 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения (при приеме внутрь) необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Настойка.

По 25 мл во флаконы или флаконы-капельницы из оранжевого стекла, укупоренные пробкой и крышкой навинчивающейся, или пробкой-капельницей и крышкой навинчивающейся, или крышкой навинчивающейся с уплотняющим элементом, или колпачком алюминиевым.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку.

Флаконы, флаконы-капельницы с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в пленку полиэтиленовую термоусадочную или в ящик из гофрированного картона, или в коробку из картона («для стационаров»).

По 3 л, 5 л, 10 л, 20 л, 31,5 л в канистры из полиэтилена низкого давления («для стационаров» или «для производственных отделов аптек»).

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 8 до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «БЭГРИФ», Россия, 633010, Новосибирская обл., г. Бердск,

ул. Химзаводская, 11/19

Тел./факс (383) 212-59-73, (383-41) 2-97-53

Директор ООО «БЭГРИФ»



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "С.И. Тимофеев". It is enclosed in a blue oval.

С.И. Тимофеев

Пропущено, пронумеровано и

скреплено печатью

количество листов

3

Зам. директора по качеству

А.Б. Пасека



Минздрав России

МГ-001293- 02 05 17

СОГЛАСОВАНО