

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## ПРОПОЛИСА НАСТОЙКА

**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Прополиса настойка**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Прополис

**Лекарственная форма:** Настойка**Состав****Для получения настойки используют:**

Прополис - 100 г

Этанол (этиловый спирт) 80 % - достаточное количество до получения  
1000 мл препарата**Описание**

Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета с характерным запахом прополиса.

**Фармакотерапевтическая группа**

Репарации тканей стимулятор природного происхождения.

**Код АТХ:** D06BX**Фармакологические свойства**

Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

**Показания к применению**

Микротравмы и поверхностные повреждения кожных покровов и слизистых оболочек, хронический отит, фарингит, тонзиллит, заболевания пародонта.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и продуктам пчеловодства, поллинозы, острая экзема, детский возраст до 18 лет.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

**Способ применения и дозы**

Наружно, местно, ингаляционно.

Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов (микротравмами) обрабатывают тампоном, смоченным настойкой прополиса, 1-3 раза в день.

При хронических гнойных отитах после тщательной очистки от гноя в ухо вводят тампон, пропитанный настойкой прополиса, на 1-2 минуты 2-3 раза в день или по 1-2 капли в ухо 3-4 раза в день.

При хроническом фарингите и тонзиллите настойкой прополиса смазывают миндалины 1-2 раза в день в течение 8-15 дней. Кроме того, при хроническом тонзиллите водно-спиртовой раствор настойки прополиса (в соотношении 1:20) используют для ингаляций. Курс лечения 1-2 ингаляции в день в течение 7-10 дней.

При заболеваниях пародонта настойку прополиса вводят на турундах в пародонтальные карманы на 5 минут после глубокого кюретажа.

При повреждениях слизистой оболочки полости рта водно-спиртовой раствор настойки прополиса (15 мл на  $\frac{1}{2}$  стакана теплой воды) применяют для полосканий 4-5 раз в день в течение 3-4 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

#### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции (зуд, покраснения кожи, сыпь), кратковременное ощущение жжения в месте нанесения препарата.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

#### **Передозировка**

До настоящего времени сведения о передозировке препарата не зарегистрированы.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не описано.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

#### **Особые указания**

При развитии аллергических реакций применение препарата следует прекратить.

#### **Форма выпуска**

Настойка.

По 15, 25, 30, 40, 50, 90, 100 мл во флаконы или флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные пробкой и крышкой навинчиваемой, или пробкой-капельницей и крышкой навинчиваемой, или крышкой, навинчиваемой с уплотняющим элементом, или колпачком алюминиевым.

По 15, 25, 50, 100 мл во флаконы или флаконы-капельницы полимерные, укупоренные пробкой и крышкой навинчиваемой, или пробкой-капельницей и крышкой навинчиваемой, или крышкой навинчиваемой, или крышкой укупорочно-навинчиваемой, или колпачком.

По 1, 3, 5, 10, 20, 21,5 или 31,5 л в канистры из полиэтилена (для стационаров или для приготовления лекарственных форм).

На флаконы, флаконы-капельницы, канистры наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся этикетки, или контрэтикетки.

На канистры наклеивают инструкции по медицинскому применению.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного марки А или типа хром-эрзац.

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку из картона.

Флаконы, флаконы-капельницы с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в пленку полиэтиленовую термоусадочную (для флаконов, флаконов-капельниц оранжевого стекла) или в ящик из гофрированного картона, или в коробку из картона (для стационаров).

На термоусадочную пленку, ящик, коробку наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся этикетки, или контрэтикетки.

#### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Производитель/организация, принимающая претензии:**

ООО «БЭГРИФ»,

633010, Россия, Новосибирская обл., г. Бердск,

ул. Химзаводская, 11/19

Тел./факс (383) 212-59-73, (383-41) 2-97-53.

Директор ООО «БЭГРИФ»



С.И. Тимофеев

Пропнуеровано, пронумеровано и


скреплено печатью

Количество листов 3

*TM*

Зам. директора по качеству

*А.В. Пасека*



МИНЗДРАВ РОССИИ  
*АСР-007276/0-130818*  
СОГЛАСОВАНО