

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА



Регистрационный номер:

Торговое наименование: Боярышника настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Боярышника плодов настойка

Лекарственная форма: Настойка

Состав.

Для получения 1 л настойки используют:

Боярышника плодов - 100 г

Этанол (спирт этиловый) 70 % - достаточное количество до
получения 1 л настойки.

Описание

Прозрачная жидкость от светло-желтого до красно-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Кардиотоническое средство растительного происхождения.

Код АТХ: C01EB04

Фармакологические свойства

Обладает умеренным кардиотоническим, спазмолитическим, седативным действием.

Показания к применению

Настойку боярышника применяют в комплексной терапии функциональных расстройств сердечной деятельности, кардиалгий, климактерического синдрома, астеноневротических состояний.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Взрослым по 20-30 капель, разведенных в ¼ стакана воды, на прием 3-4 раза в день до еды. Курс лечения 20-30 дней.

Детям старше 12 лет - по 10-15 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды, 3-4 раза в день до еды. Курс лечения 20-30 дней.

Побочное действие

В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций (крапивница, зуд), редко - головокружение, тремор, сонливость. При длительном применении в больших

дозах возможны брадикардия, артериальная гипотензия.

Передозировка

При длительном применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При комбинированном применении настойки боярышника и сердечных гликозидов (строфантин, дигоксин и др.) происходит усиление кардиотонического эффекта; с бета-адреноблокаторами - возможно усиление гипотензивного эффекта.

Особые указания

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых содержится 0,45 г, для детей - 0,23 г; в максимальной суточной дозе препарата для взрослых содержится 1,8 г, для детей - 0,9 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и др.).

Форма выпуска

Настойка.

По 15, 25 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробкой и крышкой навинчиваемой, или пробкой-капельницей и крышкой навинчиваемой, или крышкой навинчиваемой с уплотняющим элементом, или колпачком алюминиевым.

По 15, 25 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные пробкой-капельницей и крышкой навинчиваемой, или пробкой и крышкой навинчиваемой, или крышкой навинчиваемой с уплотняющим элементом.

По 15, 25 мл во флаконы или флаконы-капельницы полимерные, укупоренные пробкой и крышкой навинчиваемой, или укупоренные пробкой-капельницей и крышкой навинчиваемой, или крышкой навинчиваемой, или крышкой укупорочно-навинчиваемой, или колпачком.

На флаконы, флаконы-капельницы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся этикетки, или контрэтикетки.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного марки А или типа хром-эрзац.

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку из картона.

Флаконы, флаконы-капельницы с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в пленку полиэтиленовую термоусадочную или в ящик из гофрированного картона, или в коробку из картона (для стационаров).

На термоусадочную пленку, ящик, коробку наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся этикетки, или контрэтикетки.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

ООО «БЭГРИФ»,
633010, Россия, Новосибирская обл., г. Бердск,
ул. Химзаводская, 11/19.
Тел./факс (383) 212-59-73, (383-41) 2-97-53



Директор ООО «БЭГРИФ»

С.И. Тимофеев

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-004134/09-1120718
СОГЛАСОВАНО



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
с отразившимся количеством листов 3
Зам. директора по качеству
А.Б. Пасека