

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
МЕДИЦИНСКИЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ РАСТВОР

Регистрационный номер:

Торговое название: Медицинский антисептический раствор.

МНН или группировочное название: этанол.

Химическое название: этиловый спирт.

Лекарственная форма: раствор для наружного применения

Состав:	40 %	70 %	90 %
Спирт этиловый (этанол) 95 %	360 г	675 г	927 г
Вода очищенная	640 г	325 г	73 г

Описание: прозрачная бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ [D08AX08]

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Противомикробное средство, при местном применении оказывает антисептическое действие (денатурирует белки микроорганизмов). Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Антисептическая активность повышается с увеличением концентрации этанола. Для обеззараживания кожи используют 70 % раствор, лучше проникающий в более глубокие слои эпидермиса, чем 90 %, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Лечение начальных стадий заболеваний: фурункул, панариций, мастит; обработка рук хирурга (способы Фюрбрингера, Альфреда), операционного поля (в том числе у лиц с повышенной чувствительностью к другим антисептикам, у детей и при операциях на областях с тонкой кожей, у взрослых - шея, лицо). В качестве местнораздражающего средства.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Гиперчувствительность.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Наружно, в виде примочек. Для обработки операционного поля и предоперационной дезинфекции рук хирурга используют 70 % раствор, для компрессов и обтираний (во избежание ожога) рекомендуется использовать 40 % раствор. 90 % раствор должен быть разведен до необходимых концентраций и использован по показаниям.

В качестве раздражающего средства - в виде обтираний и компрессов.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Аллергические реакции, ожоги кожи, покраснение и болезненность кожи в месте компресса.

При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки и может оказывать резорбтивное общетоксическое действие (угнетение центральной нервной системы).

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Раствор для наружного применения 40 %, 70 %, 90 %.

По 50, 100 мл в банки, флаконы или бутылки из оранжевого стекла. Каждый флакон, банку или бутылку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного. Флаконы, банки или бутылки с равным количеством инструкций по применению помещают в ящик из гофрированного картона или коробку из картона (для стационаров). Допускается текст инструкции по применению наносить на пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В хорошо закупоренной таре, вдали от огня при температуре от 12 до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.


УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК:

По рецепту.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «БЭГРИФ», 633010, г. Бердск, Новосибирской области,
ул. Химзаводская, 11/19
Тел./факс (383) 212-59-73, (383-41) 2-97-53

И.о. Директора



А.Н. Васильев

Директор ООО «БЭГРИФ»



С.И. Тимофеев